

オオムラサキ *Sasakia charonda* (チョウ目タテハチョウ科)



撮影：中村 寛志



撮影：大野 豊

生態情報

I からだの特徴

はねを開いた時の幅が 10 cm ぐらいの大きくて美しいチョウです。はねは、オスは黒褐色で白色と黄色の紋があり、中央部が紫色に輝きます。メスはオスよりひとまわり大きいですが、紫色の輝きはありません。

I すみ場所

北海道・本州・四国・九州に分布しています。おもに平地から山地の落葉広葉樹林やそのまわりに多くすんでいます。

I 生活のようす

成虫は年1～2回発生し、6月下旬～8月下旬にみられ、クヌギ、コナラなどの樹液に好んで集まります。幼虫はエノキ、エゾエノキの葉を食べます。幼虫は冬になると、木をおりて枯れ葉のなかにじっとしていますが、春になると、また木に登って葉を食べはじめます。

参 考

大きさと美しさから日本の「国のチョウ」に指定されている、日本を代表するチョウです。また、全国的に少なくなっているチョウで、「環境省レッドリスト」で「準絶滅危惧種」に、「長野県版レッドリスト」で「留意種」に、「レッドデータブックにいがた」で「準絶滅危惧」に選定されています。

ヒメギフチョウ

Luhdorfia puziloi inexpecta (チョウ目アゲハチョウ科)



撮影：中村 寛志



幼虫の食草(ウスバサイシン)

現地撮影

生態情報

I からだの特徴

はねを開いた時の幅が 50 mm ぐらいの中型のチョウです。はねには黄色と黒のしま模様があり、後ろばねに橙、青、赤色の斑点を持ちます。

I すみ場所

北海道と中部地方より北の本州に分布しています。おもに山地の落葉広葉樹林にすんでいます。

I 生活のようす

成虫は年1回発生し、4月中旬～5月上旬にみられ、カタクリ、スミレ類などの花の蜜を吸います。アゲハチョウの仲間では飛びかたは弱々しく感じます。幼虫はウスバサイシンの葉だけを食べ、さなぎで冬を過ごします。

参 考

早春に限ってみられるチョウで、ギフチョウとともに「春の女神」と呼ばれ、とても人気のあるチョウです。すみ場所の開発や人間の採集などにより、全国的に少なくなっているチョウで、「環境省レッドリスト」で「準絶滅危惧種」に、「長野県版レッドリスト」で「留意種」に選定されています。

ミヤマカラスアゲハ

Papilio maackii (チョウ目アゲハチョウ科)



撮影：大野 豊

生態情報

I からだの特徴

まえばねの長さが 40～75 mm ぐらいの大きなチョウです。はねは黒色ですが、光があると青緑色に美しく輝きます。

I すみ場所

北海道・本州・四国・九州などに分布しています。おもに山地を中心に普通にみられ、溪流沿いなどにすんでいます。

I 生活のようす

成虫は年2回ぐらい、5月～9月に発生し、溪流沿いのツツジ類、タニウツギなどの花の蜜を吸ったり、集まって水を吸う姿をよくみかけます。幼虫はミカン科のキハダ、カラスザンショウなどの葉を食べます。

参 考

大型で美しく、溪流沿いでよくみかけるチョウのひとつです。

クモマツマキチョウ

Anthocaris cardamines (チョウ目シロチョウ科)



現地撮影

生態情報

I からだの特徴

まえばねの長さが 20～22 mm ぐらいの小さなチョウです。はねは白色で、後ろばねの裏面には不規則な黄緑色の紋があり、オスは表面に鮮やかなオレンジ色の紋を持っています。

I すみ場所

本州中部に分布しています。おもに中部山岳地帯に源流を持つ各河川の中、上流域にみられ、溪谷沿いの草地にすんでいます。

I 生活のようす

成虫は年1回、5月から発生し、高い場所では7月ごろまでみられ、溪流沿いのハタザオ類、スミレ類などの花の蜜を吸います。幼虫はアブラナ科のミヤマハタザオ、イワハタザオなどの葉を食べます。

参 考

高地の溪流環境と関わりを強く持った虫のひとつです。また、全国的に少なくなっているチョウで、「環境省レッドリスト」で「準絶滅危惧種」に、「長野県版レッドリスト」で「準絶滅危惧」に選定されています。

ツマグロキチョウ

Eurema laeta betheseba (チョウ目シロチョウ科)



撮影：大野 豊

生態情報

I からだの特徴

はねを開いた時の幅が 35 mm ぐらいのチョウです。はねの色は、黄色で前ばねの縁が帯状に黒くなっています。

I すみ場所

本州・四国・九州に分布しています。おもに丘陵地の河川の堤防や河原、田畑のあぜ道などの背丈の低い草地にすんでいます。

I 生活のようす

成虫は年1回、6月ごろより発生し、秋に多くみられ、メドハギの花の蜜を吸ったり湿地で水を吸ったりします。幼虫はカワラケツメイの葉を食べます。成虫で冬を過ごします

参 考

おもに河川の河原草地にすんでいるため、河川環境と関わりを強く持った虫のひとつです。また、全国的に少なくなっているチョウで、「環境省レッドリスト」で「絶滅危惧Ⅱ類」に、「長野県版レッドリスト」で「絶滅危惧ⅠA類」に選定されています。

クモマベニヒカゲ

Erebia ligea (チョウ目ジャノメチョウ科)



撮影：中村 寛志



撮影：大野 豊

生態情報

I からだの特徴

はねを開いた時の幅が 45 mm ぐらいのチョウです。はねは黒褐色で、前ばねは、外側に沿って並ぶ蛇の目のような紋を取り囲むようにして、大きな橙色の紋があります。後ろばねの裏面には白色の帯があります。

I すみ場所

北海道と本州中部の山岳地帯に分布しています。おもに高山のガケや急斜面の草地、林のまわりの小さな草地などにすんでいます。

I 生活のようす

成虫は年1回発生し、7月中旬～8月にみられ、高山植物のお花畑などをゆるやかに飛んでいます。幼虫はイネ科やカヤツリグサ科植物の葉を食べます。卵から成虫になるまで2年かかります。

参 考

高山性の珍しいチョウで、長野県の「天然記念物」に指定されているほか、「環境省レッドリスト」で「準絶滅危惧種」に、「長野県版レッドリスト」で「留意種」に選定されています。

ベニヒカゲ

Erebia niponica (チョウ目ジャノメチョウ科)



現地撮影

生態情報

I からだの特徴

前ばねの長さが 23mm ぐらいの小さなチョウです。はねは黒褐色で、前ばねは、外側に沿って並ぶ蛇の目のような紋を取り囲むようにして大きな橙色の紋があります。

I すみ場所

北海道と本州中部の山岳地帯に分布しています。おもに高山の明るい草地にすんでいます。

I 生活のようす

成虫は年1回発生し、7月下旬～8月中旬にみられ、高山植物のお花畑などをゆるやかに飛んでいます。幼虫はカヤツリグサ科のホンモジスゲ、タニスゲ、ヒメカンスゲ、タテヤマスゲなどの葉を食べます。

参 考

高山性の珍しいチョウで、長野県の「天然記念物」に指定されているほか、「環境省レッドリスト」で「準絶滅危惧種」に、「長野県版レッドリスト」で「留意種」に選定されています。

ツマジロウラジャノメ

Lasiommata deidamia (チョウ目ジャノメチョウ科)



現地撮影

生態情報

I からだの特徴

はねを開いた時の幅が 55 mm ぐらいのチョウです。はねは褐色で蛇の目のような紋があり、また、前ばねには表裏とも白紋がありよく目立ちます。

I すみ場所

北海道・本州・四国に分布しています。本州では標高 800～2000m に多くみられ、おもに渓谷沿いのガケ地などにすんでいます。

I 生活のようす

成虫は温暖な地方では年3回、寒冷な地方では1～2回発生で、5～9月にみられます。岩場にはねを半開きにしてとまったり、ヒメジョオンなどの花を訪れます。幼虫はイネ科のヒメノガリヤスの葉を食べます。成虫で冬を過ごします。

参 考

ガケ地のあるような山地の溪流環境と関わりを強く持った虫のひとつです。

オオマルクビゴミシ

Nebria macrogona (コウチュウ目オサムシ科)

(写真準備中)

生態情報

I からだの特徴

からだの大きさが 16～20 mmぐらいで、マルクビゴミシ仲間では大きな種類です。からだの色は黒色で足と触角は黄褐色です。はねの先に細い黄褐色の紋があります。

I すみ場所

北海道・本州・四国・九州に分布しています。おもに溪流沿いの河原に生息していて、特に砂や石の多い場所にすんでいます。石の下でよくみかけます。

I 生活のようす

成虫で冬を過ごすため1年中みられますが、4～10月に活発に活動します。成虫、幼虫とも肉食で、小さな虫などを捕まえて餌としたり、動物の死体に集まります。

参 考

おもに河原にすんでいるため、河川環境と関わりを強く持った虫のひとつです。

ミヤマハンミョウ

Cicindela sachalinensis (コウチュウ目ハンミョウ科)



現地撮影

生態情報

I からだの特徴

からだの大きさが 14～18 mmぐらいの大きなハンミョウです。からだの色は暗い緑色で乳白色の斑紋があります。からだの下面は緑色で赤色の輝きがあります。

I すみ場所

北海道・本州・四国に分布し、富山県が本州の分布範囲の最も西側にあたります。おもに山岳地帯で土砂の露出した斜面やガレ場、林道沿いなどに多くすんでいます。

I 生活のようす

ほとんど飛ぶことはありませんが、林道などでみつけた場合は、人の進む方向に先へ先へと移動して行きます。成虫、幼虫とも肉食で、おもにほかの虫や土壌動物を捕まえて餌とします。

参 考

高山帯を代表する虫で、分布の上からも重要な種類です。